

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Pipi NITOLIC® prevent plus

Warunkiem skutecznej terapii jest ściśle przestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji oraz używanie wyrobu medycznego zgodnie z jego przeznaczeniem. Przed użyciem wyrobu zapoznaj się z instrukcją. Zachowaj instrukcję, aby móc ponownie zapoznać się z jej treścią.



SPIS TREŚCI:

1. ZASTOSOWANIE
2. DZIAŁANIE WYROBU
3. SKŁAD
4. SPOSÓB UŻYCIA
5. PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA
6. OSTRZEŻENIA
7. PRZECHOWYWANIE
8. USUWANIE ODPADÓW
9. OBJAŚNIENIE SYMBOLI
10. INFORMACJE DODATKOWE

1. ZASTOSOWANIE

Pipi NITOLIC® prevent plus jest wyrobem medycznym przeznaczonym do ochrony przed zarażeniem wszawicą (*pediculosis*). Wyrób przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego – do aplikacji na włosy.

2. DZIAŁANIE WYROBU

Działanie wyrobu medycznego Pipi NITOLIC® prevent plus jest oparte na fizycznym sposobie działania. Preparat pokrywa powierzchnię włosa tworząc film, który uniemożliwia pasożytom zagnieżdżenie i złożenie jaj. Działanie ochronne utrzymuje się do umycia włosów.


3. SKŁAD

PEG-12 dimetikon, hydrolizowane proteiny pszenicy, olejek z drzewa herbacianego, olejek z mięty pieprzowej, olejek lawendowy, etoksylogowany olej rycynowy, fenoksyetanol/etyloheksylogliceryna, woda

4. SPOSÓB UŻYCIA

1

Umieść aplikator z atomizerem w buteleczce i dokładnie go dokręć.



2

Wstrząśnij przed użyciem.



3

Równomiernie rozpyl Pipi NITOLIC® prevent plus na suche włosy z odległości ok. 15 cm.



4

Pozostaw produkt do naturalnego wyschnięcia. Nie spłukuj.



Zalecany do codziennego stosowania:

- gdy w najbliższym otoczeniu dziecka (np. w szkole) rozpoznano wszawicę
- gdy istnieje ryzyko ponownego zarażenia wszawicą
- w trakcie i po powrotach dzieci z kolonii, obozów i wycieczek

Jeśli codzienne stosowanie nie jest możliwe, zaleca się aplikowanie wyrobu na włosy przynajmniej dwa razy w tygodniu.

Jeżeli produkt będzie nakładany na włosy, które zostaną związane, należy wykonać aplikację dopiero po ich zwiazaniu.

Ważne!

Działanie ochronne utrzymuje się do umycia włosów.

5. PRZECIWSKAZANIA DO STOSOWANIA

- Nie stosować wyrobu u dzieci poniżej drugiego roku życia.
- Nie stosować w przypadku uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek składnik wyrobu.
- Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę.
- W razie wystąpienia działania niepożądanego należy natychmiast zaprzestać stosowania wyrobu i skonsultować się z lekarzem.
- Bezwzględnie unikać kontaktu z oczami, błonami śluzowymi ust i nosa.
- W razie konieczności zastosowania preparatu u dzieci poniżej drugiego roku życia, kobiet w ciąży oraz w trakcie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności oraz w przypadku uszkodzenia opakowania.

W przypadku wystąpienia incydentu medycznego związanego z wyrobem, należy zgłosić go producentowi i właściwemu organowi (Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych).

7. PRZECHOWYWANIE

Wyrób medyczny należy przechowywać w suchym, nienastłonecznionym miejscu, niedostępnym dla dzieci, w temperaturze od 5°C do 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.














6. OSTRZEŻENIA

- Przed pierwszym zastosowaniem zaleca się sprawdzić możliwość działania uczulającego: niewielką ilość Pipi NITOLIC® prevent plus nanieść na skórę dłoni lub przedramienia i obserwować, czy nie wystąpią reakcje niepożądane.
- W przypadku kontaktu z oczami lub błoną śluzową należy natychmiast przemyć te miejsca dużą ilością letniej wody przez 10-15 minut. Jeśli podrażnienie nie ustąpi po upływie 15 minut, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Aplikację wyrobu u dzieci może przeprowadzić wyłącznie osoba dorosła.
- W przypadku niezamierzonego połknięcia produktu zaleca się kontakt z lekarzem jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane.
- Wyrób należy aplikować z daleka od powierzchni ścian, mebli i innych przedmiotów, w pomieszczeniach z łatwo zmywalnymi ścianami i podłogami.

8. USUWANIE ODPADÓW

Produkt należy usuwać do odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Puste opakowanie nadaje się do recyklingu.

9. OBJAŚNIENIE SYMBOLI

| | | |
|---|--|--|
|  Producent wyrobu medycznego |  Data ważności |  Zachować ostrożność podczas obsługi wyrobu |
|  Wyrób medyczny |  Limity temperatury |  Unikalny identyfikator wyrobu |
|  Znak CE potwierdzający zgodność z wymaganiami UE dla wyrobów medycznych |  Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone |  Chronić przed światłem |
|  Numer partii wyrobu medycznego |  Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkownika |  Chronić przed wilgocią |
| | |  Numer identyfikacyjny produktu |

10. INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe wskazówki dotyczące ochrony przed zarażeniem się wszawicą i jej rozprzestrzenianiem się:


- Wytłumacz dziecku, by nie używało akcesoriów do włosów (spinek, gumek, opasek), nakryć głowy i szalików innych dzieci
- Regularnie czyść szczotki, grzebienie lub inne używane akcesoria do włosów, unikaj pożyczania tych przedmiotów innym osobom
- Nie wieszaj kurtek i płaszczy blisko siebie - w razie potrzeby przechowuj odzież w plastikowych torbach
- Spinaj długie włosy
- Regularnie przeprowadzaj kontrolę włosów pod kątem obecności wszy lub gnid. Do tego celu używaj grzebienia o gęstych, metalowych ząbkach. Szczególną uwagę zwracaj na miejsca za uszami i z tyłu głowy.

Dowiedz się więcej o naszych produktach - odwiedź stronę

www.nitolic.pl



ICB Pharma sp. z o.o.
ul. S. Lema 10
43-603, Jaworzno, Polska
www.icbpharma.com
office@icbpharma.com

 Informacja na opakowaniu jednostkowym wyrobu medycznego